OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 2 fr.)

42,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
COMP. ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

CINQUIÈME FASCICULE

(25 Mars 1913)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1913

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

Etude synoptique du genre FALSOMYCTERUS Pic

J'ai décrit le genre *Falsomycterus* (l'*Echange*, n° 268) pour caractériser une curieuse espèce brésilienne qui, en plus allongé, offrait assez l'aspect de *Mycterus* Clairv. avec une curieuse structure des tibias antérieurs, ceux-ci étant aplatis et triangulairement dentés en dedans. Depuis, j'ai ajouté trois autres espèces et j'en possède actuellement une autre inédite, que je vais tout d'abord brièvement décrire.

F. Wagneri. Elongatus, nitidus, fusco aut albido pubescens, niger, pygidio, labro, antennis pedibusque testaceis.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence générale blanche, mais fauve sur le milieu du prothorax et le disque des élytres avec les membres, le labre, le pygidium testacés. Prothorax robuste, assez long; élytres longs, subacuminés à l'extrémité. Long. 5,5 mill. République Argentine : Haut Parana (Wagner in coll. Pic). — Voisin de *diversipes* Pic.

Les espèces du genre *Falsomycterus* Pic, dont tous les types font partie de ma collection, peuvent se distinguer ainsi qu'il suit :

1 Elytres revêtus de poils, ou squamules piliformes, plus ou moins couchés ; élytres plus ou moins longs. 2

1′ Elytres présentant, en outre de la pubescence, des poils foncés redressés ; élytres relativement courts et plus larges. Brésil : Bahia. **obscuricolor** Pic.

2 Pattes antérieures testacées ou en parties rousses ; tibias antérieurs à dent interne plus ou moins saillante. 3

2′ Pattes antérieures noires ; tibias antérieurs à dent interne émoussée. Brésil. **rufipennis** Pic.

3 Prothorax presque droit, ou peu arrondi, sur les côtés, moins transversal ; pattes antérieures moins robustes. 4

3' Prothorax fortement arrondi sur les côtés, plus transversal ; pattes antérieures plus robustes et moins claires. République Argentine : Rio Parana. **argentinus** Pic.

4 Prothorax plus robuste, un peu plus large ; revêtement pubescent du dessus du corps plus dense et plus uniformément disposé. République Argentine : San Ignacio. **Wagneri** Pic.

4' Prothorax moins robuste et un peu moins large ; revêtement pubescent du dessus du corps moins dense laissant une partie brillante sur le disque des élytres. Brésil : Nova Friburgo. **diversipes** Pic.

Nota : Mon étude synoptique étant faite, j'ai étudié une espèce entièrement testacée, originaire de Bolivie (la description en paraîtra dans le *Bulletin du Museum d'Histoire naturelle de Paris*), que j'ai nommée **Germaini** et pour laquelle j'ai cru devoir établir, sous le nom de **Boliviomycterus**, un sous-genre nouveau. Cette nouveauté offre les principaux caractères distinctifs suivants : tibias antérieurs simplement élargis vers l'extrémité, tête courte devant les yeux, élytres ornés de squamules piliformes blanches redressées.

UN GENRE ET DIVERS MALACODERMES NOUVEAUX

Gallerucocantharis n. g. Elytris brevibus, postice subplicatis.

Forme raccourcie, élytres courts, atténués à l'extrémité, légèrement plissés près du sommet, avec l'angle sutural formant un calus brillant. Ce genre, proche voisin du genre *Trybius* Fairm., est distinct par la forme particulière des élytres et son faciès de *Gallerucide*.

G. subtumidus n. sp. Satis brevis, nitidus, rubro-testaceus, oculis, antennis, pedibus, et infra corpore nigris, pygidio rufo.

Assez court, brillant, pubescent de gris, testacé-rougeâtre passant au jaune sur le devant de la tête, yeux, antennes, premier article, testacé en dessous, pattes et dessous du corps noirs. Tête avec les yeux de la largeur du prothorax ; antennes grêles et courtes ; prothorax peu long, rétréci en avant, indistinctement ponctué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, courts, atténués postérieurement, faiblement plissés vers le sommet, impressionnés au milieu derrière l'écusson et aussi sur les côtés, peu distinctement ponctués. Long. 9 mill. Bengale : Kurseong (1).

Silis costatipennis n. sp. ♀. Elongatus, fere opacus, niger, thorace lateraliter testaceo limbato, elytris costatis.

Allongé, presque opaque en dessus, pubescent de gris, noir avec seulement le prothorax largement bordé de testacé sur les côtés. Tête un peu brillante, inégale en dessus ; prothorax très transversal, un peu rétréci en avant, subsinué sur les côtés ; élytres de la largeur du prothorax, étranglés postérieurement, munis de plusieurs côtes saillantes ; dessous du corps un peu brillant. Long. 14 mill. Madagascar.

(1) Les types de cette espèce et de celles qui suivent sont dans ma collection.

Voisin de *S. multicostata* Pic, forme moins étroite, prothorax plus large, à bordure jaune simplement latérale.

Silis janeirensis n. sp. ♂. Modice elongatus, nitidus, rufo-testaceus, capite, antennis, tarsis elytrisque ad apicem late nigris.

Modérément allongé, très brillant, finement pubescent de gris, roux-testacé avec la tête, moins les parties buccales, les antennes, les tarses et près de la moitié apicale des élytres noirs. Antennes longues et grêles ; prothorax lisse sur les côtés, fortement entaillé et largement appendiculé postérieurement, l'appendice impressionné en dessus, sillonné au milieu ; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, un peu élargis postérieurement, faiblement explanés sur les côtés, à ponctuation irrégulière, forte et ruguleuse au milieu. Long. 8 mill. Brésil : Rio de Janeiro (ex-Gounelle).

Jolie espèce, se rapprochant de *S. fasciatus* Pic avec un autre système de coloration élytrale et le prothorax autrement conformé.

Silis lineatithorax n. sp. Satis elongatus, subparallelus, niger, capite antice, thorace, in disco nigro lineato, abdomine, pedibusque testaceis.

Assez allongé, presque parallèle, brillant, orné d'une pubescence grise assez dense sur les élytres et en partie surélevée, noir avec le devant de la tête, le prothorax, à l'exception d'une bande médiane longitudinale noire étroite, abdomen et pattes testacés, tarses rembrunis, antennes tachées de roux en dessous des 1ers articles. Antennes peu robustes ; prothorax transversal, entaillé sur le milieu des côtés ; élytres à peine plus larges que le prothorax, pas très longs, subparallèles, rugueusement ponctués. Long. 5 mill. République Argentine : Rio Parana.

A placer près de *Bang-Haasi* Pic, de coloration différente, pattes claires, etc.

Silis bugabensis. Elongatus, subnitidus, luteo pubes-

cens, infra niger, supra testaceus, longitudinaliter nigro lineatus, antennis nigris, apice testaceis.

Allongé, un peu élargi postérieurement, peu brillant, pubescent de blanc, noir avec le dessous testacé, orné d'une bande médiane noire sur la tête et le prothorax, celle-ci se prolongeant variablement sur la suture des élytres ; antennes noires à derniers articles testacés ; pattes noires avec la moitié basale des cuisses testacée ; prothorax presque carré, fortement sinué sur les côtés ; élytres densément et ruguleusement ponctués. Long. 7 mill. Panama : Bugaba et Chiriqui.

Etait confondu dans la collection Gorham avec *S. lineata* Gorh. qui présente une coloration noire plus étendue sur les élytres avec les antennes foncées à l'extrémité. Varie (**var. apicipennis mihi**) par les élytres largement marqués de noir à l'extrémité.

Laius externenotatus n. sp. ♀. Elongatus, nitidus, niger, thorace testaceo, in disco nigro notato, elytris, albido maculatis, antennis pedibusque pro parte testaceis.

Allongé, brillant, pubescent de gris, noir avec le prothorax testacé, maculé de noir sur le disque, la base des antennes, partie des tibias et tarses testacés, élytres noirs à reflets bleutés, ornés d'une bordure suturale médiane et de deux macules blanches, l'antérieure plus large et plus externe que la postérieure, la première avant le milieu, la 2e en dessous, antennes à 1er et 2e articles longs, 3e et suivants courts ; prothorax long, rétréci en arrière ; élytres à ponctuation forte et rapprochée. Long. 4 mill. Indes.

Voisin de *L. jucundus* Bourg. avec des dessins différents sur les élytres.

Laius alorensis n. sp. Satis latus, paulum nitidus, nigro-cyaneus, elytris ad medium rubro fasciatis.

Assez large, à peine brillant, orné d'une pubescence grise avec des poils redressés longs, densément ponctué et plus fortement sur les élytres que sur l'avant-corps, noir bleuâtre avec les élytres ornés au milieu d'une assez large bande

rougeâtre sinuée. ♂ avec les antennes tachées de jaune en dessus, sauf au sommet, à 1er article épaissi et creusé, le 2e épaissi, chez ♀ celles-ci sont foncées, avec le 1er article un peu épais, le 2e long et aplati. Long. 3 m. 5. Iles Alor (ex Doherty).

Voisin de *Dohertyi* Pic, plus robuste avec la bande élytrale rouge plus large et les antennes différentes.

Hapalochrous Simoni n. sp. ♂. Modice elongatus, nitidus, cæruleus, abdomine pedibusque testaceis, antennis flabellatis.

Modérément allongé, un peu élargi en arrière, pubescent de gris avec quelques poils redressés, brillant, bleu métallique en dessus, noir en dessous avec l'abdomen testacé, pattes de cette dernière coloration. Antennes flabellées, testacées avec les rameaux des articles 4 et suivants plus ou moins foncés ; tête et prothorax peu distinctement ponctués, ce dernier transversal, impressionné au milieu ; élytres pas plus larges que le prothorax aux épaules, élargis en arrière, assez longs, très finement et subruguleusement ponctués, à rebord saillant ; tibias antérieurs sinués, médians épaissis et creusés. Long. 5 mill. Quingua (E. Simon).

Par ses antennes flabellées et ses élytres élargis postérieurement se rapproche de *H. Sjostedti* Bourg., la ponctuation est différente, les tibias médians sont obscurcis, etc.

Dromanthus Germaini n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, niger, elytris cæruleis, thorace testaceo, in disco nigro maculato, antennis pedibusque gracilibus, nigris, tibiis pro parte rufescentibus.

Voisin de *D. maculithorax* Pic, plus brillant, de forme plus allongée, avec les élytres, à faible repli latéral, ayant une coloration nettement bleue. Long. 4 mill. 5. Bolivie : Cochabamba (ex Germain).

Descriptions de 29 Espèces

ET DE PLUSIEURS VARIÉTÉS

Bruchus albofasciatus n. sp. Niger, infra albido pubescens, supra albido fasciatus, antennis ad basin pedibusque 4 anticis testaceis.

Assez grand et un peu allongé, rétréci aux deux extrémités, brillant, densément revêtu de pubescence blanche en dessous et en dessus avec une bande basale au prothorax et trois bandes (faites de macules allongées juxtaposées) sur les élytres, 1re vers l'écusson, les autres un peu avant et après le milieu, se réunissant vers la suture, celles-ci blanches, base des antennes et 4 pattes antérieures testacées. Tête longue ; prothorax conique, rugueusement ponctué ; élytres subovalaires, strié-ponctués avec les intervalles larges, épaules effacées ; pygidium long ; pattes postérieures robustes, paraissant inermes. Long. près de 5 mill. Afrique : Sierra Leone (1).

Cette jolie espèce me paraît devoir se placer près de *B. niveoguttatus* Mots.

Bruchus leonensis n. sp. Niger, griseo aut fusco pubescens, elytris lineatis et maculatis, antennis ad basin, pedibus 4 anticis, abdomine pygidioque testaceis.

Forme du précédent, mais dessins bien différents, la pubescence condensée sur le prothorax et les élytres en bandes fauves ou en macules grisâtres, enfin pygidium et abdomen testacés, densément revêtus de pubescence jannâtre. Long. 5 mill. Sierra Leone.

Bruchus (Pachybruchus) testaceipennis. Brevis, niger, elytris luteo-testaceis, pedibus pro parte testaceis.

(1) Les types des espèces et variétés décrites ici font partie de ma collection.

Court, noir, un peu brillant, élytres d'un jaune testacé, modérément pubescent de blanc en dessus et densément en dessous, quatre pattes antérieures en partie testacées, postérieures foncées. Tête courte ; antennes flabellées ; prothorax conique, inégal en dessus, à ponctuation pas très forte et peu serrée ; élytres courts et larges, striés, les stries ponctuées de points forts, intervalles étroits, surélevés. Long. 5 mill Brésil : Goyas.

A placer près de *B. coryphæ* Ol., mais prothorax foncé, autrement ponctué, etc.

Bruchus (Callosobruchus) malaccanus n. sp. Satis latus, niger, luteo aut albido variegatus, antennis ad basin pedibusque 4 anticis testaceis.

Assez large, noir, opaque, orné en dessus de macules ou courtes lignes jaunes ou blanches, poitrine et pygidium densément pubescents de blanc, base des antennes et quatre pattes antérieures testacées. Tête longue ; antennes longues, fortement pectinées ; prothorax conique, élevé en gibbosité sur le milieu de la base, cette gibbosité terminée par une callosité blanche ; écusson allongé, pubescent de blanc ; élytres courts et larges, strié-ponctués, ornés d'une petite macule jaune sur la suture derrière l'écusson et de nombreuses petites macules blanches ; pattes postérieures robustes, cuisses finement dentées en dedans. Long. 3 mill. Malacca : Perak (ex Doherty).

Cette jolie petite espèce peut se placer près de *B. nigripennis* Allard qui ne m'est connu que par la description.

Notoxus jamaicus n. sp. Niger, cornu, antennis pedibusque testaceis, elytris in disco linea sinuata testacea ornatis.

Noir, brillant, revêtu d'une pubescence grise avec des poils clairs dressés, dessous du corps plus ou moins roux, dessus noir avec la corne testacée ainsi que les pattes et antennes, élytres noirs ornés chacun, sur le milieu du disque, d'une fascie testacée sinuée partant de la base et recourbée sur la suture postérieurement pas loin du sommet. Long. 3 m. 5. Jamaïque.

Voisin de *N. Dugesi* Pic, du Mexique, en diffère par les dessins élytraux différents, les poils dressés des élytres, etc.

Formicomus sikkimensis n. sp. ♀. Rufo-testaceus, oculis et infra corpore nigris, elytris latis, nigro-viridescentibus.

Brillant, éparsément pubescent de gris, avant-corps allongé, élytres larges, roux-testacé avec les yeux et l'abdomen foncés, les élytres d'un noir métallique à reflets verdâtres. Tête rétrécie postérieurement ; prothorax long, assez élargi en avant, subsillonné sur le disque ; élytres courts et larges, dilatés vers le milieu, rétrécis à l'extrémité, subtronqués au sommet, à ponctuation fine. Long. 4 mill. Indes : Sikkim.

Voisin de *F. rufopiceus* Fairm., mais de forme plus élargie.

Formicomus rufopiceus v. nov. rufobasalis. Elytres à base assez largement roussâtre, taille avantageuse, prothorax modérément ponctué. Long. 5 mill. Indes : Mandi.

Formicomus cæruleipennis v. nov. talianus. ♀. Allongé, testacé-rougeâtre tête comprise avec le dessous du corps et les pattes en partie foncés, les élytres étant d'un vert métallique. Chine méridionale : Tali.

Formicomus robusticollis n. sp. Satis robustus, testaceus, elytris nigro-piceis ante et post medium testaceo maculatis.

Assez robuste, brillant, éparsément pubescent de gris avec des poils redressés sur les élytres, testacé avec les élytres d'un noir de poix, ornés de larges macules testacées, avant et après le milieu, extrémité des antennes rembrunie. Tête subarquée en arrière, fortement et éparsément ponctuée ; prothorax ponctué de même, celui-ci robuste est un peu plus long que large ; élytres courts et larges, largement subarrondis au sommet, à ponctuation forte et écartée ; pattes robustes. Long. 3,5 mill. Indes : Chambaganor.

Voisin de *F. Fouqueti* Pic, plus fortement ponctué et de coloration différente.

Formicomus bogorensis n. sp. ♀. Parum elongatus, rubro-testaceus, elytris nigris, abdomine, antennis pedibusque pro parte nigris.

Peu allongé, brillant, orné de poils gris espacés, en partie redressés, testacé-rougeâtre avec le milieu de l'abdomen, partie des antennes et des pattes foncés. Tête un peu rétrécie postérieurement, très finement ponctuée ; antennes noires à base testacée ; prothorax plus long que large, muni sur le disque d'un large sillon peu profond ; élytres relativement courts et larges, séparément arrondis au sommet, finement ponctués. Long. 4,5 mill. Ile Bogor.

Voisin de *F. Modigliani* Pic, mais distinct, à première vue, par le prothorax muni d'un large sillon médian.

Formicomus luzonicus n. sp. Elongatus, niger, elytris viridescentibus.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise espacée, en partie redressée, noir avec les élytres verdâtres, membres foncés ou vaguement rembrunis, avec d'ordinaire la base des cuisses plus claire. Tête arquée postérieurement ; prothorax long, faiblement creusé sur le disque ; élytres étroits et allongés ; pattes antérieures simples ♀, chez ♂ les cuisses munies d'un appendice court et très large, tronqué au sommet et tibias dentés intérieurement. Long. 5-5,5 mill. Luzon.

Voisin de *F. angustipennis* Pic, bien distinct par sa structure fémorale ♂ et par les élytres non acuminés au sommet.

Formicomus elongatissimus n. sp. ♂. Maxime elongatus, rufescens, elytris pro parte obscuris, albido fasciatis.

Très allongé, avant-corps surtout, orné d'une pubescence grise, roussâtre avec les élytres en partie plus foncés, à reflets métalliques, ceux-ci ornés, près de la base, d'une fascie transversale étroite de pubescence blanche. Tête longue, rétrécie en cône postérieurement, assez fortement ponctuée ; antennes foncées à base testacée ; prothorax par-

fois obscurci, presque mat, long et étroit, à ponctuation dense, substrigueuse ; élytres brillants, longs, et assez étroits, presque lisses à la base, modérément ponctués derrière la fascie blanche ; cuisses antérieures munies d'une épine mince, tronquée au sommet, tibias sinués, à courte dent interne. Long. 5,5 mill. Indes : Pegu.

Cette jolie espèce, bien distincte par sa forme et sa structure fémorale, peut se placer près de *F. Mellyi* Pic.

Anthicus Kannegieteri n. sp. Elongatus, nigro-piceus, capite rufescente, antennis pedibusque testaceis, elytris ad basin et postmedium testaceo fasciatis.

Allongé, déprimé, pubescent de gris, noir de poix avec la tête roussâtre, antennes et pattes testacées, élytres ornés de deux fascies testacées, la 1re près de la base large, la 2e en dessous du milieu, étroite et un peu oblique. Tête grosse, subarquée postérieurement ; prothorax assez long, fortement élargi en avant, étranglé près de la base ; élytres peu plus larges que le prothorax, assez courts, subtronqués au sommet. Long. 2,5 mill. Sumbawa (ex Kannegieter).

Peut se placer près de *A. Bangi* Pic, de forme plus allongée, élytres bifasciés, etc.

Anthicus Confucii v. nov. obscuripennis. Elytris nigris.

Se distingue à première vue par la coloration foncée des élytres. Formose ; Chine (coll. Pic).

Anthicus guatemalanus n. sp. Elongatus, niger, capite pro parte rufescente, antennis femoribusque ad basin et tarsis testaceis, elytris testaceo bimaculatis.

Allongé, noir avec la tête en partie roussâtre, presque opaque sur l'avant-corps, brillant sur les élytres qui sont assez larges et ornés, près de la base et en dessous du milieu, de macules testacées, à revêtement pileux gris, la macule antérieure placée dans une dépression, base des antennes et des cuisses, ainsi que les tarses, testacés. Tête arquée derrière les yeux ; prothorax assez long, un peu étranglé devant la base et bordé de roux postérieurement ;

élytres pas très longs, finement ponctués ; pygidium saillant. Long. 3,5 m. Guatemala.

Peut se placer près de *A. maculifer* Pic, dont il est bien distinct par la tête moins robuste et les élytres bimaculés.

Anthicus nankineus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, capite nigro, elytris ad medium nigro notatis.

Oblong, convexe, brillant, orné d'une pubescence grise longue et couchée, testacé avec la tête noire et les élytres maculés de noir vers leur milieu, ayant une petite macule sombre avant le sommet. Tête large, subarquée postérieurement, à ponctuation forte et rapprochée ; prothorax peu plus long que large, dilaté-arrondi en avant ; presque droit sur la base, à ponctuation forte et dense ; élytres assez courts, un peu rétrécis et subarrondis au sommet, à ponctuation forte, peu écartée. Long. 2,5 mill. Nankin.

A placer près de *A. trabeatus* Fairm., de forme moins robuste avec la tête plus foncée.

Anthicus guyanensis var. nov. surinamensis. Forme un peu plus allongée avec la pubescence plus distinctement soulevée sur les élytres et les antennes testacées avec l'extrémité foncée. Surinam.

Anthicus (Aulacoderus) robustissimus n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, niger aut nigro-piceus, antennis ad basin, tibiis tarsisque testaceis.

Oblong, brillant, revêtu d'une pubescence grise peu serrée et couchée, à ponctuation assez forte et peu serrée, noir ou noir de poix, base des antennes, tibias et tarses testacés. Tête arquée derrière les yeux ; antennes grêles, assez épaissies à l'extrémité ; prothorax court, anguleusement élargi en avant, à sillon à peine indiqué et tout à fait postérieur ; élytres larges, à épaules marquées, subarrondis à l'extrémité ; pygidium un peu saillant. Long. 2 mill. Afrique australe : Salisbury.

Voisin de *A. reverendus* Pic avec les élytres non fasciés et le prothorax concolore.

Hylophilus albonotatus n. sp. Latus, subnitidus, griseo pubescens, rufescens, antennis ad medium nigris, elytris postice albo notatis.

Large, à peine brillant, revêtu d'une pubescence grise un peu soulevée, élytres ornés en partie de dessins blancs dont une grande macule postérieure latérale, faite d'une pubescence soyeuse blanche et roussâtre, avec les antennes foncées sur leur milieu, celles-ci robustes et longues, à dernier article roux, subtronqué au sommet. Tête subtronquée postérieurement, yeux gris, gros, éloignés du bord postérieur de la tête et écartés entre eux ; prothorax un peu plus long que large, subsillonné sur le disque, à angles antérieurs effacés ; élytres bien plus larges que le prothorax, courts, assez convexes, à faible dépression antérieure, fortement ponctués ; pattes postérieures assez longues et un peu épaissies. Long. 2 mill. Malacca : Perak.

Peut se placer près de *H. Françoisi* Pic, les yeux sont plus éloignés du bord postérieur de la tête, le prothorax plus long, etc.

Hylophilus martapuranus n. sp. Elongatus, subnitidus, griseo pubescens, niger, pedibus pro parte tarsisque testaceis.

Allongé, déprimé, un peu brillant, finement pubescent de gris, noir avec les quatre pattes antérieures en partie et les tarses testacés. Tête subarquée derrière les yeux, ceux-ci grands, assez éloignés entre eux et touchant presque le bord postérieur de la tête ; antennes longues, foncées avec le sommet du dernier article rembruni ; prothorax assez court, rétréci en avant, impressionné en dessus ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, impressionnés et déprimés en avant, distinctement rétrécis postérieurement, assez fortement ponctués ; pattes postérieures un peu épaissies. Long. 4 mill. Bornéo : Martapura.

Cette espèce, bien reconnaissable à sa grande taille, peut se placer près de *H. Modiglianii* Pic.

Pseudocistela viridimetallica n. sp. Fere glaber, nitidus, niger, supra corpore viridi-metallica.

En ovale allongé, brillant, presque glabre, noir avec le dessus du corps d'un vert métallique. Antennes foncées, épaissies, sauf à la base ; tête assez courte, plus étroite que le prothorax ; prothorax court, rétréci en avant, à ponctuation fine et espacée ; élytres peu plus larges que le prothorax, modérément atténués postérieurement, faiblement striés-ponctués avec les intervalles médiocrement ponctués. Long. 5-6 mill. Sumatra : Mana Riang.

Cette jolie espèce, de forme plus ovalaire et taille moindre que les espèces d'Afrique, peut se placer (ex description) près de *P. densepunctata* Fairm.

Pseudocistela testaceithorax n. sp. Fere glaber, nitidus, niger, elytris viridi-metallicis, thorace testaceo.

Très voisin de l'espèce précédente, mais de forme un peu moins allongée avec les élytres plus densément ponctués, le prothorax plus large et de coloration testacée. Long. 6 mill. Mana Riang.

Uroplatopsis pallidipes n. sp. Satis elongatus, nitidus, parallelus, niger, thorace lateraliter et pedibus, pro majore parte, pallidis, elytris lateraliter pallido lineatis.

Assez allongé, brillant, parallèle, noir, côté du prothorax largement et pattes presque entièrement d'un testacé pâle, élytres noirs, ornés d'une bande étroite humérale testacé pâle couvrant un ou 2 intervalles. Tête grosse, tachée de jaune derrière les yeux et près des antennes. Antennes très robustes, prothorax large, fortement biimpressionné sur le disque, à angles postérieurs très saillants ; élytres assez larges, longs, parallèles, multicostés avec les intervalles fortement ponctués et plissés, pattes pâles, un anneau aux cuisses, sommet des tibias et tarses plus ou moins rembrunis. Long. 9 mill. Guyane française : Kourou (ex Le Moult).

Cette espèce, très distincte par sa forme jointe à sa coloration, peut prendre place près de *U. mimica* Champ.

Uroplatopsis annulipes n. sp. Modice elongatus, nitidus, antice attenuatus, niger, capite in medio, thorace

elytrisque lateraliter rufo-testaceis, femoribus rufo annulatis.

Peu allongé, rétréci en avant, brillant, noir, milieu de la tête, côtés du prothorax et des élytres (avec l'extrême bord noir) moins leur extrémité, d'un roux testacé. Tête petite ; antennes assez robustes, presque filiformes, à dernier article long, à peine plus étroit que les précédents ; prothorax un peu plus long que large, rétréci en avant, impressionné de chaque côté, fortement et densément ponctué, angles postérieurs assez saillants ; élytres assez larges, pas très longs, parallèles, multicostés avec les intervalles assez fortement ponctués et nettement plissés ; pattes foncées, le milieu des cuisses étant annelé de roussâtre. Long. 6 mill. Brésil : Tijuca (ex Gounelle).

Voisin de *U. inimpressa* Pic, prothorax moins rétréci en avant, antennes et coloration différentes.

Rouyerus bimaculatus v. nov. innotaticollis. Thorace nigro, immaculato. Bornéo : Brunei. Distinct de la forme type par le prothorax concolor, foncé.

Borchmannia lineaticeps v. nov. atriceps. Capite tibiisque nigris. Java : Pengaleugan.— Très distinct de la forme type par la tête et les pattes foncées, sauf l'extrême base des cuisses.

Borchmannia (1) **lateapicalis** n. sp. Satis robustus, subnitidus, niger, thorace pro parte et elytris ad basin late testaceis (*forma typica*), aut testaceis (*var. pallidipennis*).

Assez robuste, à peine brillant, presque glabre, densément ponctué sur l'avant-corps, noir avec le prothorax variablement marqué de testacé et les élytres largement testacés à la base (forme type), ou à élytres testacés, brièvement marqués de noir sur la suture et à l'extrémité (*var. pallidipennis*). Tête assez courte ; antennes épaissies à l'extrémité, à der-

(1) J'ai établi (l'*Echange*, n° 329) *Borchmannia* comme sous-genre de *Rouyerus* Pic.

nier article très long ; prothorax plus ou moins court, subtransversal, un peu élargi en arrière ; élytres un peu élargis, pas très longs, multicostés, sans côtes distinctement plus élevées avec les intervalles fortement ponctués et plissés. Long. 8-9 mill. Java : Preanger.

Elytres moins longs que chez *B. lineaticeps* Pic et prothorax plus large.

Je sépare de cette espèce à titre de variété, sous le nom de **v. brevipennis**, un exemplaire à élytres un peu plus courts, prothorax et tête un peu plus larges avec les côtes des élytres un peu plus saillantes en arrière et de la coloration de *var. pallidipennis* avec le prothorax à vague macule médiane rembrunie.

Borchmannia (Pseuduroplatopsis) (1) **longipilis** n. sp. Modice elongatus, nitidus, niger, thorace postice elytrisque in disco et antice rufo notatis, femoribus ad basin pallidis.

Modérément allongé, brillant, orné de longs poils gris dressés, noir, avec le prothorax variablement marqué de roussâtre en arrière et les élytres variablement roux sur le disque, à sommet foncé. Tête petite, à vertex impressionné ; antennes robustes, très peu plus minces à la base ; prothorax un peu plus long que large, un peu élargi postérieurement, lisse, mais marqué de points larges, irrégulièrement écartés ; élytres assez larges, pas très longs, parallèles, régulièrement multicostés avec les intervalles fortement ponctués et plissés ; pattes garnies de longs poils, foncées avec la base des cuisses pâle. Long. 6 mill. Sumatra : Mana-Riang.

Borchmannia (Pseuduroplatopsis) javanus n. sp. Modice elongatus, nitidus, niger, thorace supra elytrisque antice late testaceis, femoribus ad basin pallidis.

(1) Cette espèce et la suivante, que je classe provisoirement dans le groupe des *Borchmannia*, offrent de longs poils dressés, une ponctuation forte et irrégulière sur le prothorax, je les sépare sous-génériquement sous le nom de **Pseuduroplatopsis**. Je reviendrai, plus tard, sur ces espèces dans une nouvelle étude plus approfondie.

Modérément allongé, brillant, orné de longs poils gris dressés, noir avec le prothorax en dessus et la base des élytres largement testacés, la coloration testacée triangulairement terminée en arrière sur le disque des élytres et la coloration noire bordant ces organes sur les côtés jusqu'à la base. Long. 13 mill. Java : Monts Tengger.

Très voisin de *P. longipilis* Pic, prothorax plus fortement et moins éparsément ponctué, élytres un peu plus larges, à coloration testacée autrement disposée, etc.

Je sépare de cette dernière espèce, sous le nom de **v. Rouyeri**, un exemplaire recueilli dans les monts Kawi par feu Rouyer, qui a les élytres un peu plus courts, le prothorax moins large et en partie noir sur le disque.

Zonitomorpha sellata var. nov. Bang-Haasi. Elytris immaculatis. — Cette variété est entièrement testacée-roussâtre en dessus, bicolore en dessous avec les pattes en partie foncées et les antennes foncées. Afrique. Reçu de Bang-Haas.

Zonitomorpha sellata var. nov. testaceipes. Elytris immaculatis, antennis ad basin pedibusque, tarsis brunneis exceptis, testaceis. — Diffère de la variété précédente par la base des antennes testacée ainsi que par les cuisses de cette même coloration. Même origine que la précédente variété.

Rhipiphorus javanus n. sp, Antice et postice attenuatus, niger, thorace rufescente, profunde canaliculato, elytris ochraceis, valde acuminatis.

Rétréci en avant et surtout en arrière, brillant, orné d'une pubescence grise ou fauve, noir avec le prothorax roussâtre et les élytres ocracés. Tête petite, déprimée entre les yeux ; antennes grêles (en partie défectueuses) ; prothorax conique, long, fortement et largement sillonné sur le milieu du disque, fortement échancré de chaque côté sur la base avec les angles postérieurs un peu courbés ; élytres finement et densément ponctués, à peine plus larges que le prothorax à la base, très rétrécis et terminés en pointe au sommet, longue-

ment déhiscents, dépassés par les ailes ; pattes grêles. Long. 12 mill. Java : Sukabumi.

Cette nouveauté est très intéressante par son habitat et bien distincte de notre espèce française *Rh. paradoxus* L.

Macrosiagon vittatus v. nov. biinterruptus. Elytris nigris, luteo quadri notatis. — Chez cette variété, la coloration jaune est réduite, sur chaque élytre, à deux macules allongées, une discale antérieure, l'autre latérale. Paraguey.

Macrosiagon minasensis n. sp. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus, oculis, antennis pedibusque pro parte nigris, elytris rufo-testaceis, ad apicem nigro notatis.

Allongé, brillant, presque glabre, roux-testacé avec les yeux, antennes, partie des pattes et sommet des élytres noirs. Tête élevée sur le vertex, à ponctuation écartée. Prothorax très long, à ponctuation peu forte, écartée, lobe médian aplati et long ; élytres assez étroits et longs, déhiscents, acuminés mais non pointus au sommet, marqués sur le disque d'une impression longitudinale. Long. 12 mill. Brésil : Minas Geraes.

Voisin de *M. cordiger* Gerst., coloration différente et élytres fortement impressionnés.

Macrosiagon bipunctatus var. nov. Conradti. Niger, abdomine rufo. Guatemala (Conradt). Cette variété se distingue par la coloration plus foncée du dessus du corps.

Macrosiagon luteonotatus n. sp. Modice elongatus, postice attenuatus et acuminatus, pro maxime parte rufescens, elytris in disco pallidioribus, antennis pedibusque rufis.

Modérément allongé, très rétréci postérieurement avec les élytres terminés en pointe, brillant, presque glabre, roussâtre en dessus, rembruni par place avec le disque des élytres jaunâtre, noir, taché de roux avec une bande jaune derrière les hanches postérieures en dessous, antennes (biflabellées) et pattes rousses. Tête à vertex élevé, obconique ;

prothorax long, fortement biimpressionné à la base, assez densément ponctué ; élytres marqués sur le disque d'une impression longitudinale. Long. 9 mill. Guatemala.

Voisin de *M. Biolleyi* Pic, mais de coloration bien différente.

Macrosiagon vittatus v. nov. bahiensis. Femoribus rufo-testaceis, thorace nigro, postice testaceo limbato, elytris rufis, mediocre nigro notatis. Brésil : Bahia. — Les fémurs et les élytres sont roux (au lieu d'être noirs), ces derniers étant ornés d'une bordure basale et d'une courte bande discale postérieure noires.

Xylotrechus chinensis Chevr. **var. nov. laterufescens**. Elytris late rufescentibus, ad medium nigro bivittatis.

Prothorax noir avec une grande bande rouge médiane, peu marqué de pubescence jaune en avant, élytres roux tachés de noir à l'extrême base avec deux bandes noirâtres obliques vers le milieu et une vague bande brune droite postérieure. Long. 11 mill. Formose.

Oberea subannulipes n. sp. Angustatissimus, nitidus, griseo pubescens, niger, capite, thorace elytris ad basin testaceis, genibus pro parte rufis.

Très étroit, brillant, revêtu d'une pubescence grise couchée avec quelques poils dressés, noir avec la tête, le prothorax et la base des élytres, brièvement vers les épaules et près de l'écusson, testacés, pattes foncées avec les quatre genoux antérieurs et les crochets des tarses roux. Tête grosse, un peu plus large que le prothorax, fortement impressionnée entre les yeux ; antennes noires, un peu plus longues que le corps ; prothorax presque cylindrique, un peu plus long que large, un peu inégal en dessus, plus étroit que les élytres ; élytres très longs et étroits, un peu resserrés vers le milieu, échancrés en oblique au sommet avec les angles saillants, fortement ponctués en rangées. Long. 17 mill. Formose.

Très voisin de *O. angustatissima* Pic, plus brillant, tête fortement impressionnée entre les yeux, genoux roussâtres, etc.

Brachydactyla annulipes n. sp. Nitidus, fere glaber, testaceus, antennis pedibusque pro maxime parte nigris, femoribus testaceis, apice nigris.

Tête plus étroite que le prothorax ; antennes robustes, noires avec les premiers articles teintés de roux en dessous ; prothorax court et assez large, bien plus étroit que les élytres, multi-impressionné en dessus ; élytres courts et larges, à épaules arrondies, courtement rétrécis au sommet, faiblement striés avec les stries ponctués de points larges et profonds ; pattes très robustes. Long. 8 mill. Zanguebar.

Diffère de *B. microdera* Lac. par la forme du prothorax, les antennes plus épaisses, les cuisses bicolores, etc.

Pæcilomorpha chariensis n. sp. Subparallelus, nitidus, griseo pubescens, pectore pro parte pilis luteis ornato, niger, elytris in disco vage luteis.

Presque parallèle, brillant, fortement ponctué, revêtu d'une pubescence grise plus ou moins longue, avec des poils obscurs redressés sur l'avant-corps et la poitrine en partie recouverte de poils jaunes denses, noir, le disque des élytres étant vaguement jaunâtre. Antennes épaissies ; prothorax court, à peine arrondi sur les côtés, peu rétréci aux extrémités, à sillon basal peu marqué ; écusson large ; élytres à peine plus larges que le prothorax, pas très longs, presque parallèles, arrondis séparément au sommet. Long. 7 mill. Afrique occidentale : Chari.

Très distinct de *P. innotata* Pic, par le prothorax subcylindrique, les antennes plus épaisses et la coloration.

TITRES DES ARTICLES
CONTENUS DANS LE CINQUIÈME FASCICULE

	Pages
Etude synoptique sur le genre *Falsomycterus* Pic.	1
Un genre et divers *Malacodermes* nouveaux.	3
Descriptions de 29 espèces et de plusieurs variétés.	7